




FUNGICIDE



# Sulfostar 800 SC

Reg. No. L6982 Act No. 36 of 1947

**'n Suspensie konsentraat swam- en mytdoder vir die beheer van Poeieragtige meeldou, ander swamsiektes en sekere mytspesies en blaaspootjies in gewasse soos aangedui.**

## Wat is Sulfostar 800 SC?

- 'n Suspensie konsentraat swam- en mytdoder vir die beheer van Poeieragtige meeldou, ander swamsiektes en sekere mytspesies en blaaspootjies in appels, pere, avokado's, bone, sitrus, pampoengewasse, wingerd, mango's, perskes, pruime, appelkose, ertjies, tamaties asook blomme en sierplante.
- **SULFOSTAR 800 SC** is 'n voorkomende swamdoder met kontak- en dampaksie.
- Dit is oplosbaar in vetagtige stowwe en sodra opgelos gaan dit die plantpatogeneen se sel binne.
- **SULFOSTAR 800 SC** dood beide patogeenselle en spore.
- **SULFOSTAR 800 SC** is effekief teen die volgende myte: Spinmyte (Tetranychidae), platmyte, grysmyte, silwermyte, roesmyt en Erinose myt.

## Voordele van Sulfostar 800 SC:

- Dit is 'n vloeibare formulasie - kan volumetries afgemeet word en is stofvry.
- **SULFOSTAR 800 SC** het 'n hoë natuurlike kleefvermoë agt die klein partikelgrootte, dus meer reënbestand as poeierformulasies.
- Die klein partikelgrootte verminder risiko van blaarbrand.
- **SULFOSTAR 800 SC** versprei geredelik in die mengten en vorm 'n stabiele spuitmengsel.
- **SULFOSTAR 800 SC** blok nie spuitstukke nie, selfs teen hoë konsentrasies.
- **SULFOSTAR 800 SC** kan deur grond toegedien word.
- Lae toksisiteit, nie skadelik vir bye of natuurlike vyande soos roofmyte of skilpadkewers nie.
- **SULFOSTAR 800 SC** is goedgekeur vir gebruik in organiese landbou praktyke.
- **SULFOSTAR 800 SC** tree op as plantvoedingstof en het 'n positiewe effek op plantgroei, asook verkleuring van blare en vrugte.

## Hoe om SULFOSTAR 800 SC te gebruik?

- Afhangend van die situasie wat beheer moet word wissel die dosis van **SULFOSTAR 800 SC** tussen 150 tot 400 mL per 100 ℥ water.
- Dien toe as voldekbespuiting en verseker goeie bedekking.
- Moet nie toedien wanneer temperatuur 32°C oorskry nie.
- Moet nie binne 4 dae voor bot toedien nie.
- Moet nie minerale olie binne 4 weke na 'n swaeltoediening toedien nie.

## Waar om SULFOSTAR 800 SC te gebruik?

- **SULFOSTAR 800 SC** kan gebruik word in appels, pere, avokado's, bone, sitrus, pampoengewasse, wingerd, mango's, perskes, pruime, appelkose, ertjies, tamaties asook blomme en sierplante.



\*Sien etiket vir verdere inligting en instruksies.